PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶:

A61K 41/00

A1

(11) Numéro de publication internationale: WO 00/01412

(43) Date de publication internationale: 13 janvier 2000 (13.01.00)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/00908

(22) Date de dépôt international: 16 avril 1999 (16.04.99)

(30) Données relatives à la priorité: 98/08581 1er juillet 1998 (01.07.98) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): DIGIBIO [FR/FR]; 34, avenue des Champs-Elysées, F-75008 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BENVENISTE, Jacques [FR/FR]; 3, rue Larochelle, F-75014 Paris (FR). GUILLONNET, Didier [FR/FR]; 121, chemin du Val de Cagnes, F-06800 Cagnes-sur-Mer (FR).

(74) Mandataire: VIDON, Patrice; Cabinet Patrice Vidon, Immeuble Germanium, 80, avenue des Buttes de Coësmes, F-35700 Rennes (FR).

(81) Etats désignés: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale. Avec revendications modifiées.

(54) Title: METHOD FOR ACTIVATING AN INACTIVE SOLUTION

(54) Titre: PROCEDE POUR ACTIVER UNE SOLUTION INACTIVE

(57) Abstract

The invention concerns a method for activating an inactive solution with very low concentration of a specific biological and/or chemical substance. The method comprises a step which consists in subjecting said solution to a mechanical excitation field, in particular generated by a vortex.

(57) Abrégé

L'invention concerne un procédé pour activer une solution inactive et à très faible concentration d'une substance déterminée biologique et/ou chimique. Le procédé comprend l'étape de soumettre ladite solution à un champ d'excitation mécanique, notamment créé par un vortex.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

| AL | Albanie | ES | Espagne | LS | Lesotho | SI | Slovénie |
|----|---------------------------|----|-----------------------|----|--------------------------|----|-----------------------|
| AM | Arménie | FI | Finlande | LT | Lituanie | SK | Slovaquie |
| AT | Autriche | FR | France | LU | Luxembourg | SN | Sénégal |
| AU | Australie | GA | Gabon | LV | Lettonie | SZ | Swaziland |
| AZ | Azerbaïdjan | GB | Royaume-Uni | MC | Monaco | TD | Tchad |
| BA | Bosnie-Herzégovine | GE | Géorgie | MD | République de Moldova | TG | Togo |
| BB | Barbade | GH | Ghana | MG | Madagascar | TJ | Tadjikistan |
| BE | Belgique | GN | Guinée | MK | Ex-République yougoslave | TM | Turkménistan |
| BF | Burkina Faso | GR | Grèce | | de Macédoine | TR | Turquie |
| BG | Bulgarie | HU | Hongrie | ML | Mali | TT | Trinité-et-Tobago |
| BJ | Bénin | IE | Irlande | MN | Mongolie | UA | Ukraine |
| BR | Brésil | IL | Israël | MR | Mauritanie | UG | Ouganda |
| BY | Bélarus | IS | Islande | MW | Malawi | US | Etats-Unis d'Amérique |
| CA | Canada | IT | Italie | MX | Mexique | UZ | Ouzbékistan |
| CF | République centrafricaine | JP | Japon | NE | Niger | VN | Viet Nam |
| CG | Congo | KE | Kenya | NL | Pays-Bas | YU | Yougoslavie |
| CH | Suisse | KG | Kirghizistan | NO | Norvège | ZW | Zimbabwe |
| CI | Côte d'Ivoire | KP | République populaire | NZ | Nouvelle-Zélande | | |
| CM | Cameroun | | démocratique de Corée | PL | Pologne | | |
| CN | Chine | KR | République de Corée | PT | Portugal | | |
| CU | Cuba | KZ | Kazakstan | RO | Roumanie | | |
| CZ | République tchèque | LC | Sainte-Lucie | RU | Fédération de Russie | | |
| DE | Allemagne | LI | Liechtenstein | SD | Soudan | | |
| DK | Danemark | LK | Sri Lanka | SE | Suède | | |
| EE | Estonie | LR | Libéria | SG | Singapour | | |

10

15

20

25

PROCEDE POUR ACTIVER UNE SOLUTION INACTIVE

La présente invention concerne un procédé d'activation d'une solution inactive et à très faible concentration d'une substance déterminée biologique et/ou chimique dans un solvant. La présente invention concerne également les applications dudit procédé d'activation.

On désigne sous le terme de "très faible concentration", des concentrations comprises entre 10⁻⁶ et zéro moles par litre (M).

On connaît des méthodes de préparation de solution "hautement diluée" par dilution et agitation successive. Une des méthodes de préparation employée traditionnellement en homéopathie (méthode d'Hannemahn) consiste, à partir d'une solution relativement concentrée réalisée à l'aide d'une teinture mère (de concentration supérieure à 10^{-6} M), à procéder à une dilution d'un facteur 10 ou 100, puis à une agitation mécanique (appelée "dynamisation"). On constate après chaque opération que la solution est restée active en ce sens qu'elle déclenche une réaction au sein d'un système biologique sensible.

A titre d'exemples de solutions qui ont été préparées par la méthode cidessus décrite, on peut citer toutes les préparations homéopathiques. A titre d'exemples de systèmes biologiques sensibles permettant de tester le caractère actif de telles solutions on peut citer : le coeur isolé de cobaye (expérience de Langendorff) ou le test cutané réalisé sur la peau d'un cobaye ou d'un lapin vivant.

La nécessité de partir d'une solution active avant de procéder à une dilution puis à une agitation paraissait incontournable pour obtenir des solutions diluées actives. Les dilutions effectuées jusqu'à 10⁻⁶ M et au delà, sans mettre en oeuvre ce processus d'agitation et de dilution successives, n'ont pas permis jusqu'à présent d'obtenir de solutions

10

15

20

25

actives.

Il n'est pas sans intérêt non plus de rappeler que la technique d'agitation et de dilution mise en oeuvre par Hannemann a été extrapolée sans que l'on puisse jusqu'à présent montrer les vertues de telles hautes dilutions au delà de facteur 5 CH.

Or les inventeurs, qui sont connus pour leurs travaux sur les hautes dilutions (Nature 1988 : "Dégranulation des Basophiles humains déclenchée par une solution à haute dilution d'anticorps anti-IgE"), ont constaté de manière surprenante qu'il était de possible d'obtenir une solution active à partir d'une solution inactive et à très faible concentration d'une substance déterminée biologique et/ou chimique dans un solvant. Ils ont montré qu'une solution à très faible concentration dont l'activité est inexistante au départ, peut être rendue active par des procédés particulièrement simples à mettre en oeuvre. Ainsi, ils ont conçu un procédé qui permet de rendre active des solutions à très faible concentration sans qu'il soit nécessaire de les préparer préalablement par la technique traditionnelle des dilutions et agitations successives.

Ils ont ainsi résolu un problème dont les implications industrielles sont considérables. En effet :

- il est désormais possible de déceler des substances déterminées biologiques et/ou chimiques en solution à très faible concentration dans un solvant,
- il est désormais possible de concevoir et réaliser des médicaments mettant en oeuvre des substances déterminées biologiques et/ou chimiques en solution à très faible concentration dans un solvant,
- il est désormais possible de contrôler la production de produits à très faible concentration notamment des produits homéopathiques.

 La présente invention a donc pour objet un procédé pour activer une solution à très faible concentration d'une substance déterminée biologique

10

15

20

25

et/ou chimique dans un solvant. Ledit procédé comprend l'étape de placer ladite solution dans un champ d'excitation mécanique. Le champ d'excitation mécanique pourrait être créé, par exemple, par une onde de choc se propageant dans la solution, par des ultrasons ou des ondes sonores diffusées dans la solution, par des vibrations transmises par le récipient contenant la solution. De préférence, le champ d'excitation mécanique résulte d'une agitation violente notamment obtenue au moyen d'un agitateur de type Vortex constitué d'un disque qui tourne rapidement jusqu'à ce qu'un vortex se forme dans la colonne de liquide en cours d'agitation. Avantageusement, ladite solution est soumise à un champ d'excitation mécanique pendant au moins 15 secondes.

A titre d'exemples de substances en de solution qui ont été activées par la méthode ci-dessus décrite, on peut citer : l'arnica, l'ovalbumine, l'acétylcholine, le calcium ionophore.

Le procédé selon l'invention ne présente d'intérêt que lorsque la concentration de ladite substance déterminée dans ladite solution est inférieure à 10⁻⁶ moles par litre. En effet au dessus de 10⁻⁶ moles par litre la solution est déjà active (pharmacologie traditionnelle). Avantageusement, la concentration de ladite substance déterminée dans ladite solution est comprise dans une fourchette inférieure à 10⁻⁶ moles par litre et supérieure à 10⁻¹⁶ moles par litre.

De préférence également ledit solvant contient au moins 5% d'eau. Il est en effet apparu qu'en deçà d'une certaine proportion d'eau dans le solvant la solution soumise à un champ d'excitation mécanique reste inactive.

Il est également apparu qu'un pourcentage d'alcool d'au moins 2% dans le solvant a pour effet que la solution reste active pendant une plus longue période.

Le procédé selon l'invention comprend en outre l'étape de contrôler l'état

10

15

20

25

actif de ladite solution en mettant en oeuvre un protocole expérimental identique ou semblable à celui que l'on mettrait en oeuvre pour rendre compte de la présence de ladite substance déterminée dans un milieu qui la contiendrait.

A titre d'exemple de système biologique sensible permettant de tester le caractère actif des solutions des substances déterminées suivantes : calcium-ionophore, acétylcholine, histamine, ovalbumine (chez l'animal rendu sensible), arnica, bradykinine, anticorps anti-IgE, on peut citer : l'expérience de Langendorff (coeur de cobaye isolé) ainsi que le test cutané réalisé sur une peau de cobaye ou de lapin vivant. Ainsi par exemple, pour contrôler l'état actif de la solution d'acétylcholine on vérifie qu'une injection de celle-ci, sous la peau d'un cobaye notamment, provoque des réactions cutanées.

La présente invention concerne aussi l'application du procédé à la détection d'une substance déterminée, diluée en très faible concentration. En effet dès lors que la solution est activée, il est possible de procéder à des tests d'identification en mettant en oeuvre un protocole expérimental identique ou semblable à celui que l'on mettrait en oeuvre pour rendre compte de la présence de ladite substance déterminée dans un milieu qui la contiendrait. A titre d'exemple des substances déterminées que l'on peut détecter en solution, on peut citer les substances suivantes : calciumionophore, caféine, nicotine, toxines et endotoxines bactériennes ; et les tests d'identification suivants : l'expérience de Langendorff (coeur de cobaye isolé) ainsi que le test cutané réalisé sur une peau de cobaye ou de lapin vivant.

La présente invention concerne aussi l'application du procédé à la production de médicaments mettant en oeuvre des substances biologiques et/ou chimiques à très faible concentration. En effet, dès lors qu'il est possible de préparer des solutions actives à très faible concentration de

substances déterminées biologiques et/ou chimiques, de nouvelles applications thérapeutiques de ces substances deviennent envisageables. A titre d'exemple de médicaments que l'on peut ainsi produire, on peut citer les médicaments suivants : vasodilatateurs coronariens (ex : trinitroglycérine), bétabloquant (propranolol), caféine, nicotine.

5

10

La présente invention concerne aussi l'application du procédé au contrôle de la production de produits à très faible concentration, notamment des produits homéopathiques. En effet, l'un des problèmes à résoudre lorsque l'on fabrique des produits homéopathiques est celui du contrôle en production des dilutions successives. Le procédé selon l'invention permet de tester l'activité des produits homéopathiques lors des différentes phases de leur processus de fabrication. A titre d'exemple de produits homéopathiques dont on peut ainsi contrôler la production on peut citer les médicaments suivants : arnica 5 à 30 CH, histaminum 5 à 30 CH, acétylcolinum 5 à 30 CH, apis mellifica 5 à 30 CH.

15

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description de variantes de réalisation de l'invention, données à titre d'exemple indicatif et non limitatif, ainsi qu'à la lecture des exemples d'expérimentations ayant permis de valider le procédé d'activation, objet de la présente invention, et qui se réfèrent aux dessins annexés dans lesquels :

20

- la figure 1 représente une vue en perspective d'une variante de réalisation du système d'agitation.

25

- la figure 2 représente une vue en perspective d'un système permettant de tester l'activité de la solution (expérience de Langendorff).

- la figure 3 représente une image de la peau d'un cobaye

On va maintenant décrire la figure 1 qui représente une vue en perspective d'une variante de réalisation du système d'agitation. Un galet en caoutchouc 2 est monté pivotant autour d'un axe vertical. La galet en

caoutchouc est mis en rotation autour de l'axe vertical par un moteur électrique (non représenté), situé à l'intérieur du boitier 3. Le moteur électrique est alimenté par un cable 10. La vitesse de rotation du galet est contrôlée par un potentiomètre 4.

5

Le tube 1 contient la solution 6 de acétylcholine à la concentration de 1pM, devant être agitée violemment. L'opérateur 5 maintient l'extrémité inférieure 7 du tube appliquée contre le galet 2 en appuyant à la partie supérieure 8 du tube 1. L'extrémité inférieure 7 du tube 1 décrit un cercle 9. Il en résulte qu'un vortex se produit au sein de la solution 6. Ce vortex agite et mélange violement la solution.

10

A titre d'exemple, on va maintenant décrire en se référant à la figure 2 le test réalisée à partir d'un coeur de cobaye isolé perfusé, connu depuis 1897 (sous le nom de l' « Expérience de Langendorff ») et décrit dans les livres de pharmacologie traditionnelle, notamment dans « L'expérimentation animale en cardiologie » - Médecine - Science Inserm - Flammarion, Bernard SWYNGHEDAUW, Chapitre 3.1 P. 81 « Organe isolé : coeur isolé selon Langendorff ». Le collecteur de fraction collecte les tubes à raison de un tube par minute et mesure ainsi le débit du coeur de cobaye minute par minute.

20

15

Voici les résultats provenant des expériences effectuées avec les substances suivantes, après qu'elles aient vortexées (agitées) comme il a été décrit en se référant à la figure 1, dans un tube de 15 ml contenant 10 ml de solution :

25

- pour la première, un mélange d'acétate-choline (A-C) 1pM (acétate de sodium 1 pM + chlorure de choline 1 pM) vortexée pendant 15 secondes,
- pour la deuxième, de l'acétylcholine (ACh) 1pM vortexée pendant 15 secondes,
- pour la troisième, de l'acétylcholine (ACh) 1pM vortexée pendant 5

10

15

secondes

- pour la troisième, de l'acétylcholine (ACh) 1pM vortexée pendant 2 secondes
- pour la troisième, de l'acétylcholine (ACh) 1pM vortexée pendant 1 secondes

La solution tampon avait la composition suivante : Ca ²⁺ 2mM, NaHCO3 25 mM.

Le solvant employé dans les cinq cas était de l'eau.

Le tableau ci-après indique (en ml) la quantité de solution tampon récupérée dans les tubes collecteurs au cours du temps.

| | Exp 1 | Exp 2 | Exp 3 | Exp 4 | Exp 5 |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Temps (minutes) | acétate choline (A-C) | acétylcholine (ACh) | acétylcholine (ACh) | acétylcholine (ACh) | acétylcholine (ACh) |
| | Vortex 15s | Vortex 15s | Vortex 5s | Vortex 2s | Sans Vortex |
| 1 | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
| 2 | 3,8 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
| 3 | 3,7 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| 4 | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 3,6 |
| 5 | 3,7 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 3,8 |
| 6 | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| 7 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
| 8 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 9 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 10 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| 11 | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| 12 | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
| 13 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| 14 | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 15 | 3,7 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| 20 | 3,6 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
| 25 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
| 30 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |

Ce tableau met en évidence plusieurs choses :

a) dans le protocole expérimental les solutions sont testées avant d'être vortexées afin de vérifier qu'elles sont inactives. Les résultats de l'expérience 5 illustrent l'un de ces tests. La solution est bien inactive

avant d'être vortexée. En effet la variation de débit de 0,2ml/min (min=3,6; max=3,8) correspond aux incertitudes de mesure et aux variations normales de débit du système biologique qu'est le coeur de cobaye isolé perfusé.

5

b) la comparaison des résultats de l'expérience 1 avec l'expérience 2 montre que l'action d'agiter n'est pas suffisante en elle-même : encore faut-il que des molécules auxquelles le système biologique est sensible soient présentes. En effet un produit très voisin de l'acétylcholine, l'acétate-choline, préparée dans les mêmes conditions que l'acétylcholine, ne déclenche pas de réaction (Exp 1).

10

c) la série des expériences 2, 3, et 4 a été réalisée sur le même coeur de cobaye et montre l'influence du temps d'agitation à l'aide du Vortex sur l'activité produite dans la substance. Ainsi pour une agitation de 2 secondes on obtient une variation maximale de débit de 0,3 ml/min (min=3,5; max=3,8) alors que pour une agitation de 15 secondes on obtient une variation maximale de débit de 0,6 ml/min (min=2,8; max=3,4) A titre d'autres exemples voici les résultats provenant des expériences effectuées avec comme substance de l'acétylcholine 1pM, vortexée 15 secondes pour différentes teneurs en éthanol dans le solvant. Les expériences ont été réalisées 9 jours après l'agitation de la solution.

20

15

| % éthanol | variation du débit de l'artère coronarienne (en ml/min) | variation du débit de l'artère coronarienne (rapporté au débit moyen) |
|--------------|---|---|
| 1% | 0,6 | 10% |
| 2% | 0,7 | 14% |
| 5% | 0,9 | 18% |
| 40% | 1,1 | 26% |

10

15

20

Ce tableau met en évidence que la teneur en éthanol favorise la conservation de l'activité dans l'eau.

On va maintenant décrire en se référant à la figure 3 le test cutané chez le cobaye

Nous utilisons un cobaye vivant, auquel on injecte par voie veineuse un colorant bleu (bleu d'Evans) qui se fixe sur l'albumine sanguine. L'albumine ne sort pas des vaisseaux, sauf s'il y a inflammation, donc vasodilatation et perméation des vaisseaux, l'exemple typique d'une telle réaction chez l'homme étant l'urticaire.

Le test est réalisé en injectant sous la peau de l'animal ainsi préparé 0.1 ml de la solution dont il convient de contrôler l'activité. On mesure ensuite le diamètre des taches bleues apparues autour des points d'injection. A cet effet on scanne la peau, puis on enregistre le fichier bitmap. Ensuite on mesure la dimension en pixels des taches bleues dues à la réaction.

Les numéros 3, 4, 10, 11 qui figurent dans la première colonne du tableau ci-après correspondent aux références de la figure 3.

| N° | Solution injectée | Total Pixels en milliers |
|----|-----------------------|-----------------------------|
| 3 | ACh 1pM vortexée | 1 949 |
| 4 | ACh 1pM non vortexée | 43 |
| 10 | A-C 1pM vortexée | 25 |
| 11 | ACh 1 μM non vortexée | 1 154 |

- L'injection numéro 3 montre que la solution vortexée à très faible concentration (1pM) du neuromédiateur acétylcholine (ACh) déclenche une réaction cutanée importante (1 949 10³ pixels) par rapport à la même solution non vortexée qui ne déclenche pas de réaction comme le montre l'injection numéro 4 (43 10³ pixels).

10

- La comparaison de l'injection numéro 3 (1 949 10³ pixels) et de l'injection numéro 11 (1 154 10³ pixels) montre que l'activité d'une solution à très faible concentration vortexée est toute à fait comparable à celle d'une solution non vortexée à concentration plus élevée (1μM, concentration habituelle en pharmacologie traditionnelle)
- L'injection numéro 10 est réalisée avec une solution vortexée picomolaire (1pM) d'un produit proche de l'acétylcholine mais inactif : le mélange acétate/choline (A-C). Cette injection montre que la réaction cutanée du cobaye est bien spécifique de la nature de la substance en solution car cette solution d'acétate/choline vortexée dans les mêmes conditions que l'injection numéro 1 ne présente aucun effet (25 10³ pixels).

10

15

20

25

Revendications

- 1. Procédé pour activer une solution inactive et à très faible concentration d'une substance déterminée biologique et/ou chimique dans un solvant, ledit procédé comprenant l'étape :
 - de placer ladite solution dans un champ d'excitation mécanique.
- 2. Procédé selon la revendication 1,

ledit procédé comprenant l'étape :

- de soumettre ladite solution à une agitation pour créer ledit champ d'excitation mécanique.
- 3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, tel que la concentration de ladite substance déterminée dans ladite solution est inférieure à 10⁻⁶ moles par litre.
- 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, tel que la concentration de ladite substance déterminée dans ladite solution est comprise dans une fourchette inférieure à 10⁻⁶ mole par litre et supérieure à 10⁻¹⁶ mole par litre,
- 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, tel que ledit solvant contient au moins 5% d'eau.
- 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, tel que ledit solvant contient au moins 2% d'alcool,

(de sorte que la solution reste active pendant une plus longue période).

- 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, ledit procédé comprenant l'étape :
- de soumettre ladite solution à un champ d'excitation mécanique pendant au moins 15 secondes.
- 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 comprenant en outre l'étape:
- de contrôler l'état actif de ladite solution en mettant en oeuvre un protocole expérimental identique ou semblable à celui que l'on mettrait en

10

oeuvre pour rendre compte de la présence de ladite substance déterminée dans un milieu qui la contiendrait.

- 9. Procédé selon la revendication 8 tel que pour contrôler l'état actif de ladite solution on vérifie qu'une injection de celle-ci provoque des réactions cutanées
- 10. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 à la détection d'une substance déterminée, diluée en très faible concentration.
- 11. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 à la production de médicaments.
- 12. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 au contrôle de la production de produits à très faible concentration, notamment des produits homéopathiques.

10

15

20

25

REVENDICATIONS MODIFIEES

[reçues par le Bureau International le 27 Septembre 1999 (27.09.99); revendications 1-12 modifiées; (2 pages)]

- 1. Procédé pour réactiver une substance biologique et/ou chimique en solution diluée à très faible concentration, notamment à des concentrations inférieures à 10⁻⁶ moles par litre, susceptible de présenter en solution au moins deux états :
 - un état inactif et
 - un état actif,

lesdits états pouvant être contrôlés par la mise en oeuvre d'un protocole expérimental comparable ou identique à celui permettant de mettre en évidence les effets de ladite substance sur un récepteur sensible ;

ledit procédé comprenant au moins la seconde des deux étapes suivantes :

- l'étape de contrôler l'état de ladite substance en solution,
- l'étape de soumettre ladite substance en solution, lorsqu'elle est dans un état inactif à très faible concentration, à un champ d'excitation mécanique.
- 2. Procédé selon la revendication 1, ledit procédé comprenant l'étape de soumettre ladite substance en solution à une agitation pour créer ledit champ d'excitation mécanique.
- 3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, tel que la concentration de ladite substance en solution est inférieure à 10⁻⁶ moles par litre.
- 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, tel que la concentration de ladite substance en solution est comprise dans une fourchette inférieure à 10⁻⁶ moles par litre et supérieure à 10⁻¹⁶ moles par litre.
- 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, tel que ladite substance est en solution dans un solvant contenant au moins 5% d'eau.
- 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, tel que ladite substance est en solution dans un solvant contenant au moins 2% d'alcool,

10

15

20

(de sorte que la solution reste active pendant une plus longue période).

- 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, ledit procédé comprenant l'étape de soumettre ladite substance en solution à un champ d'excitation mécanique pendant au moins 15 secondes.
- 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 comprenant en outre l'étape de contrôler l'état actif de ladite substance en solution en mettant en oeuvre un protocole expérimental identique ou semblable à celui que l'on mettrait en oeuvre pour rendre compte de la présence de ladite substance déterminée dans un milieu qui la contiendrait.
- 9. Procédé selon la revendication 8 tel que pour contrôler l'état actif de ladite substance en solution on vérifie qu'une injection de celle-ci provoque des réactions cutanées
- 10. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 à la détection d'une substance déterminée diluée en très faible concentration.
- 11. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 à la production de médicaments.
- 12. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 au contrôle de la production de produits à très faible concentration, notamment des produits homéopathiques.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter mail Application No PCT/FR 99/00908

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 A61K41/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

| | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|---|--|-----------------------|
| X | WO 97 01355 A (SACCHETTI ANTONIO) 16 January 1997 (1997-01-16) page 1, line 6 - line 11; claims page 2, line 7 - line 16 | 1-12 |
| X | FR 2 634 381 A (MOREZ JEAN BERNARD) 26 January 1990 (1990-01-26) claims | 1-12 |
| X | NEGTIEN G. ET AL.: "Galenica 16. MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES." 1986 , GALENICA. , PARIS, FRANCE XP002098331 13176 page 90, paragraphs 2-1.3.3 | 1-12 |

| Further documents are listed in the continuation of box C. | X Patent family members are listed in annex. |
|--|---|
| *Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date ctaimed | "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family |
| Date of the actual completion of the international search | Date of mailing of the international search report |
| 20 July 1 999 | 03/08/1999 |
| Name and mailing address of the ISA | Authorized officer |
| European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Berte, M |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter and Application No

| | | PCT/FR 99/00908 | | |
|------------|---|-----------------------|--|--|
| C.(Continu | (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | |
| Category ' | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | | |
| X | CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 126, no. 10, 10 March 1997 (1997-03-10) Columbus, Ohio, US; abstract no. 126813, CRISTEA, AURELLA ET AL: "Effects of low and high dilutions of Belladonna on the isolated rat duodenum. III. Therapeutic effects in concordance with homeopathic and similar principles" XP002109671 abstract & FARMACIA (BUCHAREST) (1996), 44(5-6), 3-6 CODEN: FRMBAZ;ISSN: 0014-8237, | 1-12 | | |
| X | "50 ANNEES DE RECHERCHE EXPERIMENTALE" HTTP://www.ENTRETIENS-INTERNATIONAUX.MC/RE | 1-12 | | |
| Y | CHERCHE-HOMEO.HTML, XP002098330 page 4, line 18 - line 26 page 8, line 3 | 1-12 | | |
| Y | US 5 558 437 A (RODE DONALD W) 24 September 1996 (1996-09-24) claims | 1-12 | | |
| Y | US 3 850 580 A (MOORE D ET AL) 26 November 1974 (1974-11-26) claims | 1-12 | | |
| | | | | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

formation on patent family members

Inter vial Application No PCT/FR 99/00908

| Patent document cited in search repor | t | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| WO 9701355 | Α | 16-01-1997 | IT RM950433 A AU 6240696 A | 27-12-1996 30-01-1997 |
| FR 2634381 | Α | 26-01-1990 | NONE | |
| US 5558437 | Α | 24-09-1996 | NONE | |
| US 3850580 | Α | 26-11-1974 | NONE | |

∍ Internationale No PCT/FR 99/00908

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 A61K41/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification sulvi des symboles de classement)

CIB 6 A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

| Catégorie ' | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents | no. des revendications visées |
|-------------|---|-------------------------------|
| X | WO 97 01355 A (SACCHETTI ANTONIO) 16 janvier 1997 (1997-01-16) page 1, ligne 6 - ligne 11; revendications page 2, ligne 7 - ligne 16 | 1-12 |
| X | FR 2 634 381 A (MOREZ JEAN BERNARD) 26 janvier 1990 (1990-01-26) revendications | 1-12 |
| X | NEGTIEN G. ET AL.: "Galenica 16. MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES." 1986 , GALENICA. , PARIS, FRANCE XP002098331 13176 page 90, alinéas 2-1.3.3 | 1-12 |

| Yoir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents | Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe |
|---|---|
| "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "E" document publié avant la date de dépôt international, mais | "document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention ("document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément ("document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieure autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier ("document qui fait partie de la même famille de brevets |
| Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée | Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale |
| 20 juillet 1999 | 03/08/1999 |
| Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale | Fonctionnaire autorisé |
| Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016 | Berte, M |

KAPPUKI DE KECHEKCHE INTERNATIONALE

Den enternationale No
PCT/FR 99/00908

| | | PCT/FR 99/00908 | |
|-------------|--|---|--|
| C.(suite) D | OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | |
| Catégorie * | Identification des documents cités, avec.le cas échéant. l'indicationdes passages p | ertinents no. des revendications visées | |
| Χ . | CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 126, no. 10, 10 mars 1997 (1997-03-10) Columbus, Ohio, US; abstract no. 126813, CRISTEA, AURELLA ET AL: "Effects of low and high dilutions of Belladonna on the isolated rat duodenum. III. Therapeutic effects in concordance with homeopathic and similar principles" XP002109671 abrégé & FARMACIA (BUCHAREST) (1996), 44(5-6), 3-6 CODEN: FRMBAZ;ISSN: 0014-8237, | 1-12 | |
| X | "50 ANNEES DE RECHERCHE EXPERIMENTALE" HTTP://WWW.ENTRETIENS-INTERNATIONAUX.MC/RE CHERCHE-HOMEO.HTML, XP002098330 | 1-12 | |
| Υ | page 4, ligne 18 - ligne 26 page 8, ligne 3 | 1-12 | |
| Υ | US 5 558 437 A (RODE DONALD W) 24 septembre 1996 (1996-09-24) revendications | 1-12 | |
| Y | US 3 850 580 A (MOORE D ET AL) 26 novembre 1974 (1974-11-26) revendications | 1-12 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

KAPPUKI DE KEUMEKUME INTEKNATIONALE

Renseignements relatifs . . . membres de familles de brevets

Den 3 Internationale No PCT/FR 99/00908

| Document brevet ci au rapport de recher | | Date de publication | Membre(s) de la famille de brevet(s) | Date de publication |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| WO 9701355 | Α | 16-01-1997 | IT RM950433 A AU 6240696 A | 27-12-1996 30-01-1997 |
| FR 2634381 | Α | 26-01-1990 | AUCUN | |
| US 5558437 | Α | 24-09-1996 | AUCUN | |
| US 3850580 | Α | 26-11-1974 | AUCUN | |

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| - | |
|---|--|
| ☐ BLACK BORDERS | |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES | |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING | |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING | |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES | |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS | |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS | |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT | |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY | |
| Потить | |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.